

服用に際して、この文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

# ゼネルミン

## 第3類医薬品

### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい  
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	悪心・嘔吐

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

2. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。

軟便、下痢

### 成分及び分量 1日量(30mL中(1本10mL×3))

ベンフォチアミン(V・B <sub>1</sub> )	60mg
リボフラビン(V・B <sub>2</sub> )	2mg
ピリドキシン塩酸塩(V・B <sub>6</sub> )	5mg
ニコチン酸アミド(ナイアシン)	30mg
アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物	200mg
加工大蒜	30mg
添加物として、白糖、果糖ブドウ糖液糖、クエン酸、d1-リンゴ酸、安息香酸Na、パラベン、エタノール、希塩酸、香料、グリセリンを含有します	

### 効能又は効果

○次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労

○脚気

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」

○次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

### 用法及び用量

下記の量を1日3回食後服用して下さい

15才以上 1回 1瓶(10mL)

### 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

## お問い合わせ先

発売元 : ゼネル薬品工業株式会社

電話番号 : 06 - 6352 - 2381

受付時間 : 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元 ゼネル薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造元 ゼネル薬工伊都株式会社 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1